

## EQUISETUM CHT MASSÓ

Los documentos SANCO/12386/2013 y SANTE/10594/2021 establecen las condiciones y cultivos en los que se pueden utilizar Equisetum y quitosano, que se resumen a continuación:

I documenti SANCO/12386/2013 e SANTE/10594/2021 stabiliscono le condizioni e le colture su cui possono essere utilizzati l'Equiseto e il chitosano, che si riassumono come segue:

Os documentos SANCO/12386/2013 e SANTE/10594/2021 estabelecem as condições e as culturas em que o Equisetum e o quitosano podem ser utilizados, que se resumem do seguinte modo:

Cultivo / Colture / Cultura	Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANCO/SANTE)	Nº max. De aplic./mass. di applicazioni	Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni	Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais
Berries / Piccoli frutti / Bagas (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra/ar livre e estufa) SANTE/10594/2021				
Olivo / Oliveira SANTE/10594/2021	Elicitor, aumenta la resistencia de la planta contra hongos patógenos y bacterias.  Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.  Elicitor, aumenta a resistência da planta contra fungos patogénicos e bactérias	4-8	2 semanas /settimane	Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de la primera hoja del tallo principal hasta el desarrollo de los frutos.  Applicare mediante trattamento fogliare a partire dalla formazione della prima foglia fino allo sviluppo dei frutti.  Aplicar mediante pulverização foliar desde o desenvolvimento da primeira folha do ramo principal até ao desenvolvimento dos frutos.
Hortícolas en general / Ortaggi in generale / Horticas em geral (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra/ar livre e estufa) SANTE/10594/2021				

Cultivo / Colture / Cultura	Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANCO/SANTE)	Nº max. De aplic./mass. di applicazioni	Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni	Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais
Fresal y frambueso / Fragole e lamponi / Morangueiro e framboesa SANCO/12386/2013	Botrytis cinerea, oidio (Podosphaera aphanis), Phytophthora (Phytophthora fragariae), Antracnosis (Colletotrichum acutatum) / Botrytis cinerea, oidio (Podosphaera aphanis), Phytophthora (Phytophthora fragariae), Antracnosis (Colletotrichum acutatum).	4-8	5-14 días/giorni	Aplicar mediante pulverización foliar desde el crecimiento de las yemas hasta la maduración del fruto (BBCH 1-89). Aplicar máximo 50 l/ha por ciclo de cultivo. / Appicare mediante trattamento fogliare a partire dalla crescita delle gemme fino alla maturazione del frutto (BBCH 1-89). Appicare massimo 50 l/ha ogni ciclo colturale. / Aplicar mediante pulverização foliar desde o crescimento das gemas até à maturação do fruto (BBCH 1-89) Aplicar no máximo 50 l/ha por ciclo cultural.
Manzano y melocotonero / Melo e pesco / Macieira e pessegueiro SANCO/12386/2013	Moteado (Venturia inaequalis), oidio, abolladura (Taphrina deformans) / Ticchiolatura (Venturia inaequalis), oidio, bolla (Taphrina deformans) / Pedrado (Venturia inaequalis), oidio, Lepra (Taphrina deformans)	2-3	7 días/giorni	Aplicar mediante pulverización foliar. Appicare mediante trattamento fogliare. Aplicar mediante pulverização foliar.
Patata / Batateira SANCO/12386/2013	Mildiu (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani) / Phytophthora infestans, Alternaria (Alternaria solani)	4-8	5-14 días/giorni	Aplicar mediante pulverización foliar. Aplicar un máximo de 50 l/ha por ciclo de cultivo. / <i>Appicare mediante trattamento fogliare. Appicare massimo 50 l/ha per ciclo colturale.</i> / Aplicar mediante pulverização foliar. Aplicar no máximo 50 l/ha por ciclo cultural.

Cultivo / Colture / Cultura	Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANCO/SANTE)	Nº max. De aplic./mass. di applicazioni	Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni	Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais
Vid/Vite / Videira SANCO/12386/2013	Mildiu y oídio / Peronospora e oidio	2-6	7 días/giorni	<p>Aplicar mediante pulverización foliar desde apertura de yemas (BBCH 10) hasta floración (BBCH57). Aplicar máximo 34 l/ha por ciclo de cultivo.</p> <p>Aplicar mediante trattamento fogliare a partire dall'apertura delle gemme (BBCH10) fino alla fioritura (BBCH57). Applicare massimo 34 l/ha per ciclo colturale.</p> <p>Aplicar mediante pulverização foliar desde a abertura das gemas (BBCH 10) até à floração (BBCH 57). Aplicar no máximo 37 l/ha por ciclo cultural.</p>

Cultivo / Colture / Cultura	Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANCO/SANTE)	Nº max. De aplic./mass. di applicazioni	Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni	Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais
Cereales / Cereali / Cereais SANTE/10594/2021				Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de las primeras hojas.
Cultivos forrajeros Colture foraggere Culturas forrageiras SANTE/10594/2021	Elicitor, aumenta la resistencia de la planta contra hongos patógenos y bacterias.  <i>Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri.</i>	4-8	2 semanas /settimane	<i>Applicare mediante trattamento fogliare a partire dallo sviluppo delle prime foglie.</i>
Especies / Spezie / Especiarías (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra/ar livre e estufa) SANTE/10594/2021				Aplicar mediante pulverização foliar desde o desenvolvimento das primeiras folhas.
Ornamentales / Ornamentali / Ornamentais (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra) SANTE/10594/2021	Elicitor, aumenta a resistência da planta contra fungos e bactérias.	1-8	5-7 días/giorni	Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de las hojas hasta la senescencia (BBCH 10-92).  <i>Applicare mediante trattamento fogliare a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla senescenza (BBCH 10-92). /</i>  Aplicar mediante pulverização foliar desde o desenvolvimento das folhas até à senescência (BBCH 10-92).

**Dosis / Dose:** 2 - 6 l/ha, excepto manzano y melocotonero a 4 - 8 l/ha / eccetto mela e pesca a 4 - 8 l/ha / exceto macieira e pessegueiro, onde a dose é: 4 - 8 l/ha.

**P.S. / I.S. (días/giorni):** NP

Utilizar el mínimo volumen de caldo indispensable para mojar el cultivo. Se recomienda realizar los tratamientos con bajo-medio volumen de agua. Seguir las recomendaciones de los documentos SANCO/12386/2013 y SANTE/10594/2021 correspondientes.

Utilizzare il volume minimo di acqua essenziale per bagnare la cultura. Si consiglia di eseguire i trattamenti con volume d'acqua medio-basso. Seguire le raccomandazioni dei documenti SANCO/12386/2013 e SANTE/10594/2021 corrispondenti.

Utilizar o volume mínimo de calda indispensável para molhar a cultura. Recomenda-se realizar os tratamentos com baixo-médio volume de água. Seguir as recomendações dos documentos SANCO/12386/2013 e SANTE/10594/2021.

#### **COMPATIBILIDADES / COMPATIBILITÀ / COMPATIBILIDADES:**

No aplicar en mezcla con aceites, cobre (en cultivos y variedades sensibles) y productos de reacción alcalina.

*Non applicare in miscela con olio, rame (colture e varietà sensibili) e prodotti a reazione alcalina.*

Não aplicar em mistura com óleos, cobre (em culturas e variedades sensíveis) e produtos de reação alcalina.