

168 x 25 mm



COVER (pag. 1)

168 x 25 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie...

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici.

2

Perfano, è possibile, dopo il trattamento, riscontrare erosioni fogliari (sintomo di avvenuta alimentazione). Melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, nashi in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi...

4

Pesce, nettaria, albicocco, ciliegio, susino, amarena in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 1500 l/ha di volume d'acqua.

6

Patata, in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 400-600 l/ha di volume d'acqua.

8

Patata, in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 400-600 l/ha di volume d'acqua.

10

Patata, in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 400-600 l/ha di volume d'acqua.


12

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 15 giorni per melo, patata e da 10 a 7 giorni per melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del Giappone...

14


GLUED

16



notes: The leaflet or booklet should be made of multiples of 4 pages - (4-8-12-16 ecc) the last page is always glued so the text should not be put.

EXAMPLE FOR BOOK OF 8 PAGES



168 x 25 mm

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO: insetticida a base di spinosad, principio attivo derivante da un batterio (Saccharopolyspora spinosa) naturalmente presente nell'ambiente...

Vite da vino e vite da tavola in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 400-1000 l/ha di volume d'acqua.

3

Pistacchio in pieno campo: sono consentiti al massimo 2 trattamenti. Contro Tignola delle foglie (Tortrix aurana), in pieno campo, intervenire in primavera alla schiusura delle uova con dosi di 20-30 ml/ha...

5

Il prodotto ha un effetto di contenimento nei confronti dell'afidide di verde (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) contro la fillossera del pomodoro (Trialeurodes vaporariorum)...

7

Patata, in pieno campo: sono consentiti al massimo 3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi. Dosi riferite a 400-600 l/ha di volume d'acqua.

9

Tripide degli orti (Thrips tabaci) e Tripide occidentale (Frankliniella occidentalis). Trattare alla presenza dei primi adulti con 20-25 ml/ha (200 ml/ha).

11

Il livello di infestazione. L'acqua erbosa ad uso ornamentale e sportivo: sono consentiti al massimo 2 trattamenti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 gg.

13

EXSOLANT COMPOSIZIONE: SPINOSAD puro g. 44,2 (480 g/l) Formulanti q. b. a g 100 Contiene: 1,2-benzotiazolin-3-one.

15

REPEAT COVER