

89 mm

KEMPO SORBIE

INSETTICIDA

COMPATIBILITÀ:
KEMPO® SORBIE non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina
Fitotossicità: KEMPO® SORBIE non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

90 mm

KEMPO SORBIE

INSETTICIDA

ATTENZIONE:
DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI D'USO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

90 mm

INSETTICIDA

KEMPO® SORBIE

INSETTICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PRINCIPALI PARASSITI DELLE COLTURE ORTICOLE IN PIENO CAMPO E IN SERRA, DELLE FRUTTICOLE, DELLA VITE, DELLA BARBABIETOLA, DEL MAIS, DELLE OLEAGINOSE, DELLE FLOREALI E ORNAMENTALI, DELLE FORESTALI E DEL PIOPIO.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

KEMPO SORBIE

CONTENUTO NETTO:
1 Kg

INDICAZIONE DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso. P301+P312 In caso di ingestione accompagnare da malessere: contattare un centro antiveleeni o un medico. P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P330 Sciacquare la bocca. P391 Proteggere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali/nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

UFI: YSTR-QKN4-8CCA-CMSG

Partita N.: Vedere sulla confezione
Titolare della registrazione: NUFARM ITALIA S.r.l., Viale Luigi Majno 17/A Milano; Sede operativa: Via Guelata, 5, Bologna (BO) Tel. 051 0394022
Stabilimento di produzione: NUFARM AUSTRALIA LTD., Laverton North (Australia)
Stabilimenti autorizzati per il confezionamento: CHEMARK ROM, S.r.l., Codlea, Jud. Brasov (Romania)
Distribuito da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale ITALIA: Viale Marelli, 132 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996 6107

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5° - 08029 Barcelona (Spagna) - Tel. +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com

Marchio registrato Nufarm

95 x 125 mm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie! Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) e colture orticole.
- Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano i fruttiferi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: Bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: Tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleeni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Insetticida a base di lambda-cialotrina, principio attivo dotato di ampio spettro di azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, offre anche un effetto repellente nei confronti dei fitofagi ed agisce anche a dosaggi di principio attivo contenuti.
KEMPO® SORBIE svolge un rapido effetto abbattente ed una prolungata durata di protezione. Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti, si riferiscono ad ettaro, si riporta anche il quantitativo d'acqua idoneo per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali in relazione alla dimensione delle piante (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

COLTURA	PARASSITI CONTROLLATI	DOSI DI PRODOTTO PER ETTARO	DOSI DI ACQUA E VOLUMI DI ACQUA/ETTARO
Arancio, Mandarino, Clementino	Afidi (<i>A. citricola</i> , etc.), Mosca della frutta (<i>C. capitata</i>), Cimici, Cicaline e Cocciniglie (<i>A. auranti</i> , etc.)	150/300 g/ha	15 - 20 g/hl (750 - 1500 l/ha)
Pesco, Nettareina, Albicocco	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , etc.), Lepidotteri (<i>C. molesta</i> , <i>C. funebrana</i> , <i>A. lineatella</i>), <i>Frankliniella occidentalis</i> , altri Tripidi (<i>T. major</i> , <i>T. mesasioticus</i> , etc.), Mosca della frutta (<i>C. capitata</i>), Forbicina (<i>Forficula auricularia</i>)	150/300 g/ha	20 - 30 g/hl (750 - 1000 l/ha)
Melo, Pero	Afidi su foglie non accartocciate (<i>D. plantagineus</i> , <i>L. ulmi</i> , <i>A. pomi</i>), Psille (<i>C. pyri</i> , <i>C. melanomeura</i> , <i>C. costalis</i>), Microlepidotteri prima della comparsa delle mine (<i>C. scitella</i> e <i>L. clematidis</i> spp.), Carpocapsa (<i>C. pomonella</i>), Cydia molesta, Lepidotteri defogliatori (<i>P. demissa</i> spp., <i>Eulia pulchellana</i> , <i>Agrotes</i> spp., <i>Adoxophyes</i> spp.)	100/300 g/ha Per il controllo dei lepidotteri applicare 250/300 g/ha	15 - 30 g/hl (750 - 1000 l/ha)
Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio	Adulti e le forme larvali estive del Agrilo (<i>Agrius</i> spp.), maggiolino (<i>Melolontha melolontha</i>), cimici ed afidi	150/300 g/ha	20 - 30 g/hl (750 - 1000 l/ha)
Uva da tavola e da vino	Tignone (<i>L. botrana</i> e <i>C. ambigua</i>), Contro pirale della vite (<i>B. vitis</i>), cicaline (<i>E. vitis</i> , <i>Z. rhamni</i> , <i>S. lanius</i>), mosca (<i>C. capitata</i>), popillia (<i>Popillia japonica</i>) e <i>Frankliniella occidentalis</i> .	150/300 g/ha Per il controllo delle tignole e <i>Frankliniella</i> applicare 300 g/ha	20 - 30 g/hl (600 - 1000 l/ha)
Olivo	Tignola (<i>P. oleae</i>), mosca (<i>B. oleae</i>), cocciniglie (<i>S. oleae</i>)	150/300 g/ha	15 - 20 g/hl (750 - 1500 l/ha)
Pomodoro, Melanzana, Patata, Fagiolino, Fagiolo, Pisello (tutte le colture in pieno campo e in serra), Melone, Anguria, Zucchino	Afidi su foglie non accartocciate (<i>A. aspersi</i> , <i>A. fabae</i> , <i>B. brassicae</i> , <i>B. brassicae</i> , <i>B. cardui</i> , <i>B. brassicae</i> , <i>N. ribisnigri</i> , <i>M. euphorbiae</i> , etc.), tripidi (<i>T. tabaci</i> , <i>T. angusticeps</i> , <i>F. occidentalis</i> , <i>F. intonsa</i>), dorifora (<i>L. decemlineata</i>), mosca bianca, (<i>T. vaporariorum</i>), piralidi (<i>O. nubilalis</i> , etc.), nottue defogliatrici (<i>M. brassicae</i> , <i>M. oleracea</i> , <i>G. xanthines</i> , <i>Pieris</i> spp., <i>Heliothis</i> spp., <i>spodoptera</i> spp., etc.), tignola della patata (<i>P. operculella</i>)	150/300 g/ha Contro piralidi, nottue, spodoptera e lepidotteri applicare 300 g/ha	20 - 30 g/hl (600 - 1000 l/ha)
Barbabietola da zucchero	Afidi su foglie non accartocciate (es. <i>A. fabae</i> , <i>M. persicae</i> , etc.), altica (<i>C. tibialis</i>), cleono (<i>T. mendicus</i>), lisso (<i>Lixus</i> junco) nottue defogliatrici allo scoperto (es. <i>Marnestra brassicae</i> , etc.)	100/300 g/ha	20 - 50 g/hl (500 - 600 l/ha)
Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Lino	Afidi (<i>Sitobion</i> spp., <i>Rhopalosiphum</i> spp.), cecidomia (<i>H. equestris</i>), piralide (<i>O. nubilalis</i>), cimici, lema, nottue allo scoperto (es. <i>Sesamia</i> spp., <i>Agrotis</i> spp.), <i>Diabrotica virgifera</i> e zabro gobbo (<i>Z. tenebrioides</i>)	150/300 g/ha	30 - 50 g/hl (500 - 600 l/ha)
Colza, Erba medica	Afidi su foglie non accartocciate (<i>Aphis fabae</i>), nottue allo scoperto (es. <i>Agrotis</i> spp.), meligete, Apion e Fitonomo	100/150 g/ha	20 - 25 g/hl (500 - 600 l/ha)
Culture floreali e Ornamentali	Afidi (es. <i>M. rosae</i> , <i>A. fabae</i> , <i>A. viburni</i>), tripidi (<i>T. tabaci</i> , <i>T. angusticeps</i> , <i>F. occidentalis</i> , <i>F. intonsa</i>), mosca bianca (<i>T. vaporariorum</i>), bega del garofano su larve esposte (<i>E. acerbelli</i>), altri lepidotteri defogliatori (<i>C. pronubana</i> , <i>H. cunea</i> , <i>Tortrix viridana</i> , etc.)	200/300 g/ha	20 - 30 g/hl (750 - 1000 l/ha)
Pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio	Afidi (<i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis viburni</i> , <i>Aphis craccivora</i> , <i>Eucaliptus</i> spp.), contro processionaria (<i>Thaumetopoea processionea</i> e <i>T. pityocampa</i>), altri lepidotteri defogliatori (<i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Hyphantria cunea</i> , <i>Tortrix viridana</i> , <i>Lymantria dispar</i> , etc.)	200/300 g/ha	20 - 30 g/hl (800 - 1000 l/ha)

89 mm

KEMPO SORBIE

INSETTICIDA

Effettuare per ciclo colturale, al massimo 1 trattamento per Frumento, Orzo, Colza e 2 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):

COLTURA	INTERVALLO
Mais, Sorgo	60 giorni
Lino	35 giorni
Frumento, Orzo, Colza	28 giorni
Olivo, Barbabietola da zucchero, Medica, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio	14 giorni
Vite, Melo, Pero	9 giorni
Arancio, Mandarino, Clementino, Pesco, Albicocco, Nettareina	7 giorni
Pomodoro, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Patata, Zucchino, Melone, Anguria	3 giorni