

270 x 145 mm



# U 46® M STAR

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, MAIS, MELO, PERO, AGRUMI, OLIVO  
CONCENTRATO SOLUBILE



Etichettatura ambientale

## U 46® M STAR

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:  
MCPA puro g 44,25 (= 500 g/l) (da sale dimetilamminico)  
Coformulanti q.b. a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Evitare di respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

Nufarm Italia S.r.l.  
Viale Luigi Majno, 17/A - Milano. Sede amministrativa via Guelfa, 5  
Bologna. Tel. 051 0394022

Stabilimento di produzione:  
Nufarm GmbH & Co. KG St. Peter Strasse, 25 - Linz (Austria)

Distribuito da:  
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale ITALIA:  
Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996200

Partita n: Vedere confezione

CONTENUTO NETTO:  
1 litro

Registrazione del ministero della Sanità n. 1369 del 28/06/1979.



PERICOLO



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
C/ Indústria, 325, 5ª - 02020 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 495 23 00 - Email: masso@cqmasso.com - info.italia@cqmasso.com

© Marchio registrato Gruppo Nufarm

## U 46® M STAR

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Durante la miscela, il carico, l'applicazione ed il lavaggio dell'attrezzatura indossare guanti per protezione chimica, occhiali, maschera o visiera facciale. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dalla zona non coltivata.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità dell'acqua di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** **Sintomi:** Irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, rinosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni SNC:** vertigini, atassia, iporreflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** debolezza, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono il poco la morte. **Exitus per collasso vascolare periferico.**

**Terapia:** Sintomatica.

**Consultare un Centro Antiveneni.**

## DISERBANTE SELETTIVO

**MODALITÀ D'IMPIEGO:** U46® M STAR è un erbicida ormonico per il controllo in post-emergenza delle erbe infestanti dicotiledoni su cereali e fruttiferi. È assorbito prevalentemente dalle foglie, poi viene traslocato fino ai tessuti meristemati dove esplica la sua azione erudicida.

Le infestanti a foglia larga (Dicotiledoni) sia annuali che perenni controllate sono numerose e comprendono *Achillea* spp. (cucchiaino), *Amaranthus retroflexus* (amaranto), *Brassica napus* (colza), *Chenopodium album* (farinaccio), *Cirsium arvense* (cardo campestre), *Convolvulus arvensis* (convulvolo), *Cyperus difformis* (cipero globoso), *Dipsacus erucoides* (rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Geranium* spp. (geranio), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Papaver Rhoeas* (papavero), *Raphanus raphanistrum* (ravanello), *Taraxacum officinale* (soffione).

Si versa la quantità prestabilita di U46® M STAR direttamente nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura. Si consiglia di effettuare il trattamento con tempo non tendente al piovoso e con temperature dell'aria non inferiori a 12 °C. Utilizzare 200-400 litri di acqua per ettaro con attrezzatura a bassa pressione. Numero massimo di trattamenti: 1 per ogni anno.

**Cereali (frumento, orzo, segale, triticale, avena): 1,6 - 2 litri per ettaro.** Effettuare una sola applicazione. Il trattamento si effettua tra l'accestimento e l'inizio della levata. La dose minore è consigliata su infestanti ai primi stadi di sviluppo.

**Mais: 1,6 litri per ettaro.** Il trattamento si effettua quando la coltura è allo stadio di 4 foglie.

**Agrumi, olivo, melo e pero: 2,4 litri per ettaro.** Evitare in ogni caso che il prodotto giunga a contatto, anche in forma indiretta, con la coltura. Per le applicazioni su olivo, evitare di trattare all'epoca della caduta delle olive.

**COMPATIBILITÀ:** U46® M STAR è miscibile con i preparati antiparassitari ed i concimi fogliari di più comune impiego sulle colture autorizzate.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento. Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per altri trattamenti antiparassitari.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** Il prodotto è nocivo per animali domestici e bestiame.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Sospendere i trattamenti: **70 giorni prima della raccolta per mais e cereali; 80 giorni prima della raccolta per melo, pero, agrumi e olivo.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 8/09/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23/12/2020

510006923\_062022/IT-FRONT

06/2022

V4