

URTICA CHT MASSÓ

Los documentos SANTE/11809/2016 y SANTE/10594/2021 establecen las condiciones y cultivos en los que se pueden utilizar Urtica y quitosano, que se resumen a continuación:

I documenti SANTE/11809/2016 e SANTE/10594/2021 stabiliscono le condizioni e le colture su cui possono essere utilizzati l'Urtica e il chitosano, che si riassumono come segue:

Os documentos SANTE/11809/2016 e SANTE/10594/2021 estabelecem as condições e as culturas em que a Urtica e o quitosano podem ser utilizados, que se resumem do seguinte modo:

| Cultivo / Colture / Cultura | Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANTE) | Nº max. De aplic./mass. di applicazioni | Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni | Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais |
|---|---|---|---|---|
| Cucurbitáceas / cucurbitacee SANTE/11809/2016 | Oidio, Alternaria alternata | 1-6 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta plena maduración (BBCH89). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino a completa maturazione (BBCH89). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até à maturidade completa (BBCH89). |
| Frutales (manzano, ciruelo, melocotonero, grosella, nogal, cerezo) / Fruttiferi (melo, prugna, pesco, ribes,noce, ciliegio) / Árvores de fruto (maçãs, ameixas, pereiras, groselheiros, ameixa, noz, cerejeira) / SANTE/11809/2016 | Pulgones / Afidi / Pulgões | 1-5 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar a la aparición de la plaga. / Applicare mediante trattamento fogliare alla comparsa della malattia. / Aplicar como pulverização foliar na emergência da praga. |
| | Alternaria alternata, Monilia laxa, Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer | 1-6 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta plena maduración (BBCH87). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino a completa maturazione (BBCH87). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até à maturidade total (BBCH87). |

| Cultivo / Colture / Cultura | Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANTE) | Nº max. De aplic./mass. di applicazioni | Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni | Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais |
|---|---|---|---|---|
| Manzano y peral / Melo e pero / Maçã e pêra SANTE/11809/2016 | <i>Cydia pomonella</i> | 3 | 15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar a la aparición de la plaga. / Applicare mediante trattamento fogliare allá comparsa della malattia. / Aplicar como pulverização foliar na emergência da praga. |
| Judías verdes/ Fagiolini / Feijão verde SANTE/11809/2016 | Pulgones /Afidi / Pulgões | 1 - 5 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta plena maduración (BBCH89). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino a completa maturazione (BBCH89). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até à maturidade completa (BBCH89). |
| | Ácaros /Acari (Tetranychus urticae) | 1 - 6 | 7-21 días/giorni | |
| Patata / Batata SANTE/11809/2016 | Pulgones /Afidi / Pulgões | - | - | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta final de la tuberización (BBCH49). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino alla fine della tuberizzazione (BBCH49). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até ao fim da tuberização (BBCH49). |
| | Mildiu / Peronospora | 1 - 6 | 7-15 días/giorni | |
| Lechuga y col / Lattuga e cavolo / Alface e couve SANTE/11809/2016 | Pulgones /Afidi / Pulgões | 1 - 5 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta 9 o más hojas desplegadas (BBCH19). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino 9 foglie spiegate (BBCH19). / Aplicar como pulverização foliar na Primavera/Verão até 9 ou mais folhas desdobradas (BBCH19). |

| Cultivo / Culture / Cultura | Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANTE) | Nº max. De aplic./mass. di applicazioni | Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni | Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais |
|---|---|---|---|---|
| Brásicas / Brassicaceae SANTE/11809/2016 | Pulguillas /Altica del cavolo / Pulga-da-couve (<i>Phyllotreta nemorum</i>) | 1-6 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta 9 o más hojas desplegadas (BBCH19). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino 9 foglie spiegate (BBCH19). / Aplicar como pulverização foliar na Primavera/Verão até 9 ou mais folhas desdobradas (BBCH19). |
| | Palomilla dorso de diamante /Tignola dei cavoli / Traça-da-couve (<i>Plutella xylostella</i>), Alternaria | 1-6 | 7-15 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta BBCH49 (tipica masa foliar alzanzada). / Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino BBCH49 (tipica massa fogliare raggiunta). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até BBCH49 (massa foliar elevada típica). |
| Vid / Vite / Videira SANTE/11809/2016 | Ácaros /Acari (<i>Tetranychus urticae</i>) | 1-6 | 7-21 días/giorni | |
| | Mildiu / Peronospora | 1-6 | 7-21 días/giorni | Aplicar en pulverización foliar en primavera-verano hasta plena maduración (BBCH89.)/ Applicare mediante trattamento fogliare in primavera-estate fino a completa maturazione (BBCH89). / Aplicar por pulverização foliar na Primavera/Verão até à maturidade completa (BBCH89). |

| Cultivo / Culture / Cultura | Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANTE) | Nº max. De aplic./mass. di applicazioni | Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni | Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais |
|---|---|---|---|---|
| Berries / Piccoli frutti /Bagas (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra/ar livre e estufa) SANTE/10594/2021 | Elicitor, aumenta la resistencia de la planta contra hongos patógenos y bacterias. Elicitore, aumenta la resistenza della pianta contro funghi patogeni e batteri. Elicitor, aumenta a resistência da planta contra fungos e bactérias. | 4-8 | 2 semanas /settimane | Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de la primera hoja del tallo principal hasta el desarrollo de los frutos. / Applicare mediante trattamento fogliare a partire dalla formazione della prima foglia fino allo sviluppo dei frutti. |
| Olivo/Oliveira SANTE/10594/2021 | | | | Aplicar por pulverização foliar desde o desenvolvimento da primeira folha no caule principal até ao desenvolvimento do fruto. do caule principal até ao desenvolvimento do fruto. |
| Hortícolas en general / Ortaggi in generale (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra) SANTE/10594/2021 | | 4-8 | 2 semanas /settimane | Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de las primeras hojas. Applicare mediante trattamento fogliare a partire dallo sviluppo delle prime foglie. Aplicar por pulverização foliar logo que as primeiras folhas se desenvolvam. |
| Cereales / Cereali / Cereais SANTE/10594/2021 | | | | |
| Cultivos forrajeros / Colture foraggere /Culturas forrageiras SANTE/10594/2021 | | | | |
| Especies / Spezie /speciarías (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra/ar livre e estufa) SANTE/10594/2021 | | | | |

| Cultivo / Colture / Cultura | Efecto / Effetto / Efeito (demostrado según / dimostrato secondo / demonstrado segundo SANTE) | Nº max. De aplic./mass. di applicazioni | Intervalo entre aplic./Intervallo tra le applicazioni | Recomendaciones generales / Raccomandazioni generali / Recomendações gerais |
|---|--|---|---|---|
| Ornamentales /Ornamentali /Ornamentais (aire libre e invernadero/in pieno campo ed in serra) SANTE/10594/2021 | | 1-8 | 5-7 días/giorni | Aplicar mediante pulverización foliar desde el desarrollo de las hojas hasta la senescencia (BBCH 10-92). Applicare mediante trattamento fogliare a partire dallo sviluppo delle prime foglie fino alla senescenza (BBCH 10-92). Aplicar por pulverização foliar desde o desenvolvimento da folha até à senescência (BBCH 10-92). |

Dosis / Dose: 2 - 10 l/ha

P.S. / I.S. (días/giorni): 7 días/giorni; excepto/tranne/excepto PATATA/BATATA: NP

Utilizar el mínimo volumen de caldo indispensable para mojar el cultivo. Se recomienda realizar los tratamientos con bajo-medio volumen de agua. Seguir las recomendaciones de los documentos SANTE/11809/2016 y SANTE/10594/2021 correspondientes.

Utilizzare il volume minimo di acqua essenziale per bagnare la cultura. Si consiglia di eseguire i trattamenti con volume d'acqua medio-basso. Seguire le raccomandazioni dei documenti SANTE/11809/2016 y SANTE/10594/2021 corrispondenti.

Utilizar o volume mínimo de calda indispensável para molhar a cultura. Recomenda-se realizar os tratamentos com baixo-médio volume de água. Seguir as recomendações dos documentos SANTE/11809/2016 y SANTE/10594/2021.

COMPATIBILIDADES / COMPATIBILITÀ / COMPATIBILIDADES:

No aplicar en mezcla con aceites, cobre (en cultivos y variedades sensibles) y productos de reacción alcalina.

Non applicare in miscela con olio, rame (colture e varietà sensibili) e prodotti a reazione alcalina.

Não aplicar em mistura com óleos, cobre (em culturas e variedades sensíveis) e produtos de reação alcalina.